Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Национальный фонд подготовки кадров

Труды XVI Всероссийской научно-методической
конференции

Телематика'2009

Том 1. Секция А

22–25 июня 2009 года, Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики
Государственный научно-исследовательский институт информационных
технологий и телекоммуникаций "Информика", Москва
При поддержке Американского благотворительного фонда "Информатизация"

В сборнике размещены **298 статей**, представляющих четыре секций:

Секция А. Информационные ресурсы и технологии в образовании
Сопредседатели: **Иванников А.Д., Сытник А.А., Кривошеев А.О.**

Секция В. Технологии и инфраструктура телекоммуникаций
Сопредседатели: **Ижванов Ю.Л., Терещенко П.Г., Куракин Д.В.**

Секция С. Виртуальные среды, имитационные технологии и тестирование в образовании и науке
Сопредседатели: **Старых В.А., Тозик В.Т., Бояшова С.А.**

Секция D. Технологии распределенных вычислений и компьютерного моделирования в образовании и науке
Сопредседатели: **Ильин В.А., Бухановский А.В.**

Сборник издан в двух томах с единой нумерацией страниц:
в первом томе – секция **А**, во втором – **В, С, D**.

Статьи в сборнике упорядочены по городу проживания авторов в пределах каждой секции.
Для поиска статьи участника конференции из определенного города приведено оглавление каждой секции по городам (**с. 17 и 456**).

Для поиска по фамилии в конце каждого тома приведен индекс фамилий всех авторов статей (**с. 243 и 457**).

В статьях, имеющих более одного автора, фамилии докладчиков подчеркнуты.

По всем организационным вопросам обращаться в Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики:
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49. Оргкомитет конференции "Телематика'2009".
E-mail: sergeev@mail.ifmo.ru

УДК 001.3:061.61

ISBN 978-5-7577-0337-4

При $n = 1$ предел (2) имеет вид $\lim_{x_0 \rightarrow x, x_1 \rightarrow x} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ и встречается в работах Пеано.

Теорема 1. Если $f: \Omega_0 \rightarrow \mathbf{R}$ есть функция S-дифференцируемая, то для любого $x \in \Omega_0$ существует $\text{grad } f(x)$ и для предела (2) справедливо равенство

$$\lim_* F(x_0, x_1, \dots, x_n) = \text{grad } f(x). \quad (3)$$

Теорема 2. Для того чтобы непрерывная функция $f: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ была S-дифференцируемой, необходимо и достаточно, чтобы она была непрерывно дифференцируемой.

Заметим, что в теореме 2 от условия непрерывности функции f отказаться нельзя, поскольку существуют разрывные S-дифференцируемые функции (разрывы, если они имеются, находятся на границе Ω). Условие непрерывности f можно снять лишь в том случае, когда $\Omega = \Omega_0$ – открытое множество.

Формула (3) служит отправной точкой для приближенных вычислений, основанных на соотношении $\text{grad } f(x) \approx F(x_0, x_1, \dots, x_n)$. В частности, данная аппроксимация применима при решении задач математической физики с краевыми условиями вида $\left[\alpha_0 u + \alpha_1 \frac{\partial u}{\partial n} \right]_{\partial \Omega} = \varphi$. При численном решении этих задач триангуляцию множества Ω осуществляем таким образом, что $\langle x_0, x_1, \dots, x_n \rangle \in \Omega_*^{n+1}$ для всех граничных симплексов (с вершинами $x_0, x_1, \dots, x_n$).

О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ НА ПРИМЕРЕ ПРОСТЕЙШЕГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Н.В. Родионова

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Тел.: (3412) 91-61-31, e-mail: rodionov@uni.udm.ru

Если точки $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbf{R}^n$ таковы, что векторы $\Delta x_1, \dots, \Delta x_n$ (где $\Delta x_i \doteq x_i - x_0$) попарно ортогональны, а числа p_{ij} , $i, j = 0, 1, \dots, n$, таковы, что $p_{ij} = p_{ji}$, то в семействе всех полиномов вида $P(\xi) = (A\xi, \xi) + (b, \xi) + c$, $\xi \in \mathbf{R}^n$, существует ровно один такой, что: 1) матрица A симметрична; 2) $P(\frac{1}{2}x_r + \frac{1}{2}x_s) = p_{rs}$ для всех $r, s = 0, 1, \dots, n$. Согласно [1] он представим в виде

$$P(\xi) = 2 \sum_{i,j} (p_{ij} - p_{i0} - p_{0j} + p_{00}) \varphi_i(\xi) \varphi_j(\xi) - \sum_m (p_{mm} - 4p_{m0} + 3p_{00}) \varphi_m(\xi) + p_{00}, \quad (1)$$

где $\varphi_m(\xi) \doteq (\xi - x_0, \Delta x_m) / \|\Delta x_m\|^2$, $m = 1, \dots, n$.

Мы применяем формулу (1) для численного решения задач математической физики, а в рамках настоящей заметки изучается начально-граничная задача для простейшего уравнения теплопроводности

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}; \quad u(0, x) = \phi(x), \quad x \in [0, 1]; \quad u(t, 0) = \alpha(t), \quad u(t, 1) = \beta(t), \quad t \geq 0.$$

Пусть $\tau > 0$, и через Ω обозначим прямоугольник $[0, 2\tau] \times [0, 1]$. Пусть, далее, $h = \frac{1}{2N}$, где $N \in \mathbf{N}$, а точки $(\tau_i, h_j) \in \Omega$ таковы, что $\tau_i = i\tau$, $i = 0, 1, 2$, $h_j = jh$, $j = 0, 1, \dots, 2N$. Среди всего многообразия триангуляций множества Ω сетка $\{(\tau_i, h_j)\}$ порождает следующие две:

Зафиксируем числа u_{ij} , $i = 0, 1, 2$, $j = 0, 1, \dots, 2N$, такие, что $u_{0j} = \phi(h_j)$, $j = 0, 1, \dots, 2N$, $u_{10} = \alpha(\tau_1)$, $u_{20} = \alpha(\tau_2)$, $u_{1,2N} = \beta(\tau_1)$, $u_{2,2N} = \beta(\tau_2)$. Каждому узлу сетки $\{(\tau_i, h_j)\}$ сопоставим значение u_{ij} . Тогда на каждом треугольнике обеих триангуляций явно вычислимы полиномы вида (1), причем значения полиномов двух соседних треугольников совпадают на их общей границе. Данное обстоятельство позволяет определить однозначные непрерывные функции $u_\ell : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, $u_r : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$ («склеенные» из данных полиномов, соответственно для левой и правой триангуляций) и функции $u_\lambda \doteq \lambda u_\ell + (1-\lambda)u_r$, $\lambda \in [0, 1]$ (которые называем сплайнами). Разнообразие таких сплайнов определяется лишь наборами u_{ij} , $i = 1, 2$, $j = 1, \dots, 2N - 1$, и параметром $\lambda \in [0, 1]$. Это означает, что при фиксированном значении λ сплайны образуют конечномерное линейное пространство (размерности $4N - 2$). Обозначим его через $\sigma_\lambda(\Omega)$.

В качестве приближенного решения исходной задачи принимаем сплайн наилучшего приближения задачи $J = J(u) \doteq \left\| \frac{\partial u}{\partial t} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right\|_{L_2(\Omega)} \rightarrow \min$, $u \in \sigma_\lambda(\Omega)$. Ее решение сводится к решению системы уравнений $\partial J / \partial u_{ij} = 0$, $i = 1, 2$, $j = 1, \dots, 2N - 1$. Для частных производных $\partial J / \partial u_{ij}$ получены явные выражения, имеющие линейный характер относительно величин u_{ij} , $i = 0, 1, 2$, $j = 0, 1, \dots, 2N$. За счет невырожденных линейных преобразований матрица системы уравнений относительно неизвестных u_{ij} , $i = 1, 2$, $j = 1, \dots, 2N - 1$, сводится к виду, позволяющему применить метод прогонки.

Литература

1. Родионов В.И. Об аппроксимации функций многих переменных специальными сплайнами // Тр. междунар. конф. «Трехмерная визуализация научной, технической и социальной реальности. Кластерные технологии моделирования». – Ижевск: ИКИ, 2009. – С. 164 – 168.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ИРАКЕ

В.С. Ижуткин, А.В. Морозов

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

Тел.: (8362) 42-97-94, e-mail: izhutkin@marsu.ru

В работе [1] рассмотрена математическая модель военного положения в Ираке на основе системы дифференциальных уравнений.

В докладе предлагается программная реализация вышеуказанной математической модели с учетом приведенной в [1] статистики изменения численности войск коалиции и повстанцев, а также количества бомбежек и терактов.

Использование апплетов (разработанных в среде JBuilder X) позволяет динамически визуализировать математическую модель и анализировать возможные изменения ситуации в зависимости от параметров системы.

Система имеет четыре возможных случая:

- Увеличение коалиции США по величине и увеличение количества атак повстанцев.
- Размер коалиции США уменьшается и уменьшается количество атак повстанцев.
- Размер коалиции США возрастает и количество атак повстанцев становится меньше.
- Размер коалиции США уменьшается и количество атак повстанцев увеличивается.

Изменяя параметры рассматриваемой модели (численность войск коалиции и повстанцев, количество бомбежек и терактов), можно определить влияние значений этих параметров на модель, установить взаимосвязь с характеристиками реального положения в Ираке, следующего из статистики в [1], а также осуществлять прогнозирование ситуации для случаев вывода войск коалиции или увеличения контингента.

Литература

1. L.Blank, C. E. Enomoto, D.Gegax, T.McGuckin, C.Simmons. A Dynamic Model of Insurgency: The Case of the War in Iraq // Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Volume 14, Issue 2, 2008, Iss. 2, Art. 1, PP.1-28.